**PENGARUH APLIKASI PUPUK POLYHALITE DAN KCl
TERHADAP KADAR K DAN PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN
JERUK PAMELO (*Citrus maxima*) DI KEBUN PERCOBAAN
BALITJESTRO, BATU**

**Effect of Polyhalite and KCl Fertilizer Application on the K Content
and Growth of Pamele Citrus Seedlings (*Citrus maxima*) in the
BALITJESTRO Experimental Garden, Batu**

Retno Suntari^{1*}, Sutopo², Aryo Gilang Maudyansa¹

¹Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang

²Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Batu

*Penulis korespondensi: retnosuntari@ub.ac.id

Abstract

There are still many farmers in Indonesia who use a single fertilizer such as N, P, or K fertilizer. While the needs of plant nutrients are not only that nutrients but also other macronutrients. One of single fertilizer used is KCl fertilizer which only contains essential K nutrients and micro Cl nutrient elements. To overcome this problem, another source of K fertilizer that does not contain Cl is used, especially in Pamele citrus nurseries. POLY4 fertilizer is used as a source of K nutrients, because it has an excess of containing several nutrients such as K (14%), Ca (17%), Mg (6%), and S (19%). This research was conducted at the BALITJESTRO screen house and the Soil Department Laboratory, Faculty of Agriculture, Brawijaya University. The research design used was a completely randomized design with 5 treatments i.e P0 (100% MOP), P1 (50% POLY4 + 50% MOP), P2 (100% POLY4), P3 (150% POLY4), and P4 (200% POLY4). Parameters of this research were plant height, numbers of leaf, soil pH and exchangeable K, and K content in plant. Result of this study indicated that application of 50% POLY4 + 50% MOP (642 kg ha⁻¹ POLY4 + 150 kg ha⁻¹ MOP) significantly affected the height and number of leaves of Pamele orange seedlings in 12 weeks, respectively 6.39% and 13.6 % compared to 100% MOP/control (300 kg ha⁻¹ MOP). Application of 150% POLY4 (1,927 kg ha⁻¹ POLY4) significantly increased plant K level by 9.40% compared to control (300 kg ha⁻¹ MOP). Application of POLY4 fertilizer had no significant effect on pH and exchangeable K. The best dose of fertilizer in Pamele citrus nurseries is the application of POLY4 642 kg ha⁻¹ POLY4 + 150 kg ha⁻¹ MOP (50% POLY4 + 50% MOP).

Keywords : Pamele citrus, polyhalite, POLY4, MOP, soil chemical properties

Pendahuluan

Pupuk yang banyak digunakan oleh petani saat ini adalah pupuk tunggal dan pupuk majemuk yang hanya mengandung N, P, dan K. Sedangkan kebutuhan unsur hara oleh tanaman tidak hanya unsur hara tersebut, melainkan beberapa unsur hara makro lainnya. Apabila

kebutuhan unsur hara tanaman tidak terpenuhi dengan baik, maka pertumbuhan tanaman tersebut tidak optimal. Salah satu pupuk tunggal yang banyak digunakan oleh petani saat ini adalah pupuk KCl yang mengandung unsur hara esensial K dan unsur hara mikro Cl yang tidak disukai oleh tanaman. Data BPS (2017) menyatakan bahwa data impor KCl dari tahun

2011 hingga 2016 berturut-turut 2,25; 1,5; 2,3; 2,35; dan 2,27 juta ton.

Tanaman jeruk Pamelio (*Citrus maxima*) adalah tanaman buah asli berasal dari Indonesia dan sudah lama dikembangkan. Sentra penghasil jeruk Pamelio di Indonesia terdapat di beberapa provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Produksi jeruk Pamelio di Jawa Timur dari tahun 2013-2017 berturut-turut mencapai 20.793, 23.678, 15.160, 19.945, dan 20.543 ton (BPS, 2018). Produksi buah jeruk Pamelio yang fluktuatif bisa terjadi akibat kebutuhan unsur hara tanaman yang tidak terpenuhi dengan baik maupun kualitas bibit jeruk yang rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi tanaman jeruk. Oleh karena itu dibutuhkan pemupukan yang efisien pada pembibitan tanaman jeruk agar pertumbuhan jeruk optimal.

Pemupukan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk anorganik atau organik. Salah satu pupuk anorganik yang mengandung unsur hara K adalah pupuk POLY4 untuk memenuhi kebutuhan tanaman terhadap beberapa unsur hara. Pupuk POLY4 merupakan pupuk yang berbahan dasar polyhalite ($K_2Ca_2Mg(SO_4)_4 \cdot 2H_2O$). Pupuk ini berasal dari bahan tambang mineral alami yang tidak mengandung Cl dan mengandung beberapa unsur hara esensial seperti K, Ca, Mg, dan S (Yermiyahu *et al.*, 2017). Sehingga pupuk yang dapat digunakan sebagai pengganti pupuk KCl dan tidak mengandung Cl adalah pupuk POLY4. Penelitian yang dilakukan oleh Mello *et al.* (2018) yaitu melihat respon pertumbuhan tomat dengan membandingkan aplikasi Polyhalite, KCl, dan Kalium Sulfat (K_2SO_4) dengan dosis 125, 250, dan 375 kg ha⁻¹ K₂O. Aplikasi polyhalite dapat meningkatkan produksi dan serapan K pada buah tanaman tomat dan dosis terbaik didapatkan pada 375 kg ha⁻¹ K₂O. Hasil penelitian Pavuluri *et al.* (2017) dengan membandingkan aplikasi POLY4 (20 kg ha⁻¹ K₂O) dengan aplikasi NP (120 kg ha⁻¹ N dan 30 kg ha⁻¹ P₂O₅), KCl (20 kg ha⁻¹ K₂O), dan KCl+kieserite (28 kg ha⁻¹). Diketahui bahwa aplikasi POLY4 dapat meningkatkan hasil panen tomat dibandingkan dengan perlakuan Pupuk N dan P, KCl, dan KCl+kieserite.

Penelitian pupuk polyhalite terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jeruk maupun bibit jeruk belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga pada penelitian ini menggunakan pupuk POLY4 yang diaplikasikan pada tanaman jeruk saat fase pembibitan. Penelitian pada bibit tanaman jeruk dilakukan di BALITJESTRO dengan media tanam yang berasal dari endapan sungai Ledogan, Batu yang memiliki kandungan unsur hara K rendah yaitu 0,03 me 100 g⁻¹ dan pH sangat masam (3,6). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap kadar K dan pertumbuhan bibit tanaman jeruk bibit jeruk Pamelio varietas Bageng, mengetahui sifat kimia tanah pada media pertumbuhan serta mengetahui dosis terbaik pupuk POLY4 pada fase pembibitan tanaman jeruk Pamelio.

Bahan dan Metode

Waktu dan lokasi penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Januari hingga Juli 2019. Penelitian dilakukan di screen house Kebun Percobaan Tlekung Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dan analisis laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Kimia Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Hasil analisis tanah awal disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis tanah menunjukkan nilai pH 3,58 dalam kriteria sangat masam, nilai C-Organik dan N total berturut-turut 0,89% dan 0,16% dengan kriteria sangat rendah dan rendah, KTK (9,97 me 100 g⁻¹) dan Ca (2,76 me 100 g⁻¹) dalam kriteria rendah, Mg (0,42 me 100 g⁻¹), dan Na (0,24 me 100 g⁻¹) dalam kriteria rendah, sedangkan K (0,03 me 100 g⁻¹) dalam kriteria sangat rendah, dan memiliki kejenuhan basa 34,60% dengan kriteria rendah. Tekstur tanah adalah pasir dengan fraksi pasir, debu, dan liat berturut-turut 88%, 6%, dan 6%. Hasil analisis tersebut sesuai dengan ciri-ciri tanah berpasir berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darlita *et al.* (2017) yaitu memiliki pH yang sangat masam (3,95), kandungan N total memiliki kriteria yang rendah (0,1%), KTK memiliki kriteria yang rendah (9,44 me 100 g⁻¹), dan kandungan Kalium memiliki kriteria yang rendah (0,02 me 100 g⁻¹).

Tabel 1. Analisis tanah awal (BPTP, 2018).

Analisis Dasar Tanah	Nilai	Kriteria *)
pH H ₂ O	3,60	Sangat Masam
C-Organik (%)	0,89	Sangat Rendah
N (%)	0,16	Rendah
C/N Rasio	5,56	Rendah
KTK (me 100 g ⁻¹)	9,97	Rendah
Susunan Kation		
Ca (me 100 g ⁻¹)	2,76	Rendah
Mg (me 100 g ⁻¹)	0,42	Rendah
K (me 100 g ⁻¹)	0,03	Sangat Rendah
Na (me 100 g ⁻¹)	0,24	Rendah
Kejenuhan basa (%)	34,60	Rendah
Fraksi		
Pasir (%)	88	Pasir
Debu (%)	6	
Liat (%)	6	

Keterangan: *) Kriteria kadar hara tanah berdasarkan Balai Penelitian Tanah (2009).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan ulangan sebanyak 4 kali. Perlakuan pada penelitian yang dilakukan yaitu P0 (kontrol), P1 (50% KCl + 50% POLY4), P2 (100% POLY4), P3 (150% POLY4), dan P4 (200% POLY4). Bibit jeruk Pamelito yang digunakan adalah jeruk Pamelito varietas Bageng yang diperbanyak dengan metode okulasi dengan batang bawah JC (*Javansche Citroen*). Bibit dipilih berdasarkan tinggi tanaman dan jumlah daun yang seragam.

Perawatan yang dilakukan adalah penyiraman, dan penyiangan gulma. Penyiraman dilakukan sebanyak 3 hari sekali dengan air sebanyak 240 ml polybag⁻¹. Penyiangan dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan mencabut gulma yang berada disekitar bibit setiap 1 minggu sekali. Aplikasi pupuk POLY4, ZA, TSP, dan KCl dilakukan pada bibit yang telah diokulasi (berumur 2 bulan), pemupukan dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Dosis pupuk yang diaplikasikan menurut rekomendasi pemupukan dari Boughalleb *et al.* (2011) yaitu 180 kg ha⁻¹ N, 90 kg ha⁻¹ P₂O₅, dan 180 kg ha⁻¹ K₂O dan aplikasi POLY4 berdasarkan rekomendasi K menyesuaikan dengan kadar K dalam POLY4 (14%).

Parameter pengamatan

Parameter pengamatan dalam penelitian ini yaitu pada tanaman terdiri dari kadar K, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Parameter pengamatan pada tanah terdiri dari pH dan K_{dd}. Pengamatan tinggi dan jumlah daun dilakukan sebanyak 3 kali (4, 8, 12 MSA (Minggu Setelah Aplikasi)) selama penelitian di lapang berlangsung. Pengamatan pH dan K_{dd} tanah dilakukan setelah penelitian di lapang selesai dilaksanakan.

Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) taraf 5% untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Apabila terdapat pengaruh, selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan menggunakan DMRT taraf 5% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuannya. Analisis ragam dilakukan dengan menggunakan software Genstat 12th Edition.

Hasil dan Pembahasan

Tinggi tanaman

Pada pengamatan 4 MSA dan 8 MSA, perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit tanaman jeruk, tetapi berpengaruh nyata pada pengamatan 12 MSA (Tabel 2). Hasil terbaik didapatkan pada perlakuan P1 dengan rerata tinggi tanaman 51,55 cm dengan peningkatan sebesar 6,39% dibandingkan kontrol. Hasil tersebut didukung oleh pernyataan oleh Farhad *et al.* (2010) bahwa unsur hara K memegang peranan penting dalam metabolisme tanaman antara lain terlibat dalam beberapa proses fisiologi. Ditambahkan bahwa aplikasi K dan S berpengaruh nyata dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman, hal ini sesuai dengan kandungan POLY4 yang mengandung K dan S.

Jumlah daun

Rerata jumlah daun memiliki pola yang sama dengan rerata tinggi tanaman yaitu tidak terdapat pengaruh nyata dari perlakuan terhadap jumlah daun pada 4 dan 8 MSA tetapi berpengaruh pada pengamatan 12 MSA (Tabel 3). Jumlah daun tertinggi didapatkan pada perlakuan P1 yaitu 25 helai dengan peningkatan

sebesar 13,60% dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Kalium berperan penting dalam transportasi air dan unsur hara pada jaringan

xylem dan floem, sehingga unsur hara kalium sangat penting terhadap pertumbuhan daun tanaman (Thomas dan Thomas, 2009).

Tabel 2. Pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap tinggi bibit jeruk Pamelor.

Perlakuan	Rerata Tinggi Bibit Jeruk Pamelor (cm)			Peningkatan (%)
	4 MSA	8 MSA	12 MSA	
P0	34,33	34,32	48,45 bc	-
P1	32,00	34,77	51,55 d	6,39
P2	30,22	32,17	47,60 b	-1,75
P3	30,32	32,85	50,88 cd	5,01
P4	29,92	31,75	44,10 a	-8,97

Keterangan: Angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%; P0 (Kontrol), P1 (50% POLY4 + 50% KCl), P2 (100% POLY4), P3 (150% POLY4), dan P4 (200% POLY4).

Tabel 3. Pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap jumlah daun bibit jeruk Pamelor.

Perlakuan	Rerata Jumlah Daun Bibit Jeruk Pamelor (helai)			Peningkatan (%)
	4 MSA	8 MSA	12 MSA	
P0	15	16	22 a	-
P1	16	17	25 c	13,60
P2	16	16	23 ab	4,54
P3	16	16	24 b	9,09
P4	15	16	22 a	0,00

pH tanah

Aplikasi pupuk POLY4 tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pH tanah pada semua perlakuan dan tidak mengubah kriteria pH dibandingkan dengan pH tanah awal. Rerata nilai pH disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap pH pada tanah 12 MSA.

Perlakuan	pH Tanah	Kriteria*
P0	3,9	Sangat Masam
P1	4,0	Sangat Masam
P2	3,9	Sangat Masam
P3	4,1	Sangat Masam
P4	4,1	Sangat Masam

K_{dd} tanah

Aplikasi pupuk POLY4 tidak berpengaruh nyata terhadap K_{dd} tanah media tanam. Rerata nilai K disajikan pada Tabel 5. Semua perlakuan mampu meningkatkan nilai K dalam tanah

apabila dibandingkan dengan nilai K pada analisis tanah awal dari 0,03 me 100 g⁻¹ menjadi lebih besar dari 0,30 me 100 g⁻¹. Kriteria K_{dd} awal sangat rendah menjadi rendah kecuali pada perlakuan P2 (sedang). Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil yang lebih rendah dari pada penelitian yang dilakukan oleh Kumar *et al.* (2006), bahwa nilai K_{dd} tertinggi didapatkan pada dosis pupuk KCl 150 kg ha⁻¹ (0,50 me 100 g⁻¹). Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdillah *et al.* (2011) bahwa aplikasi pupuk K memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan K_{dd}. Perlakuan yang terbaik adalah aplikasi dosis 144 kg ha⁻¹ K₂O dapat menunjukkan nilai K tertinggi yaitu 0,18 me 100 g⁻¹ dibandingkan dengan perlakuan yang lain (36,72 dan 108 kg ha⁻¹ K₂O).

Tabel 5. Pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap K_{dd} pada tanah 12 MSA.

Perlakuan	K _{dd} (me 100 g ⁻¹)	Kriteria*
-----------	---	-----------

P0	0,37	Rendah
P1	0,38	Rendah
P2	0,41	Sedang
P3	0,38	Rendah
P4	0,36	Rendah

Kadar K tanaman

Unsur hara K diserap tanaman dalam bentuk K^+ , memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga dapat ditransformasikan atau disalurkan ke bagian tanaman yang lain yang kekurangan unsur hara tersebut (Nugroho, 2015). Hasil analisis ragam menunjukkan aplikasi pupuk POLY4 berpengaruh nyata terhadap kadar K tanaman. Hasil rerata kadar K pada bibit tanaman jeruk disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh aplikasi pupuk POLY4 terhadap kadar K bibit jeruk Pamelor.

Perlakuan	Kadar K (%)	Peningkatan (%)
P0	2,34 a	-
P1	2,31 a	-1,28
P2	2,46 b	5,12
P3	2,56 c	9,40
P4	2,50 bc	6,83

Kadar K tertinggi didapatkan pada perlakuan P3 (150% POLY4) yang memiliki nilai kadar K sebesar 2,56% dengan peningkatan 9,40% dibandingkan dengan perlakuan P0 (kontrol). Kadar K tertinggi tidak pada perlakuan dengan dosis tertinggi hal ini sejalan dengan penelitian Fernandez dan Guzman (2013) bahwa kadar K tertinggi pada tanaman jeruk Pamelor didapatkan pada perlakuan 150 g tanaman⁻¹ KCl yaitu sebesar 1,06% dibandingkan dengan perlakuan yang lain (225 g KCl tanaman⁻¹ dan kontrol). Penyerapan unsur hara yang optimal oleh tanaman dipengaruhi oleh pengaplikasian pupuk yang tepat, sehingga pemupukan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, serapan hara, dan kondisi unsur hara dalam tanah (Mann *et al.*, 2010).

Kesimpulan

Aplikasi dosis pupuk 50% POLY4 + 50% KCl (642 kg ha⁻¹ POLY4 + 150 kg ha⁻¹ KCl) berpengaruh nyata meningkatkan rerata tinggi dan jumlah daun bibit tanaman jeruk Pamelor pada 12 MSA berturut-turut sebesar 6,39% dan 13,60% dibandingkan dengan 100% KCl/kontrol (300 kg ha⁻¹ KCl). Aplikasi 150% POLY4 (1.927 kg ha⁻¹ POLY4) berbeda nyata meningkatkan kadar K tanaman sebesar 9,40% dibandingkan dengan 100% KCl/kontrol (300 kg ha⁻¹ KCl). Aplikasi pupuk POLY4 tidak berpengaruh nyata terhadap pH dan K_{dd}. Dosis pupuk terbaik pada pembibitan tanaman jeruk Pamelor adalah aplikasi 50% POLY4 + 50% KCl (642 kg ha⁻¹ POLY4 + 150 kg ha⁻¹ KCl).

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., Syamsiyah, J., Riyanto, D. dan Minardi, S. 2011. Pengaruh pupuk zeolit dan kalium terhadap ketersediaan dan serapan K di lahan berpasir Pantai Kulonprogo, Yogyakarta. *Bonorowo Wetlands* 1 (1): 1-7.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama. www.bps.go.id. Diakses tanggal 28 Desember 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produksi Sayuran dan Buah-buahan Tahunan di Jawa Timur Tahun 2008-2017 (ton). www.jatim.bps.go.id. Diakses tanggal 3 Desember 2018.
- Boughalleb, F., Mhamdi, M. and Hajlaoui, H. 2011. Response of young citrus trees to NPK fertilization under greenhouse and field conditions. *Agricultural Journal* 6(3):66-73.
- BPTP (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian). 2018. Laporan Hasil Pengujian Tanah. No 251.1/166/LT/12/2018.
- Darlita, RR., Joy, B. dan Sudirja, R. 2017. Analisis beberapa sifat kimia tanah terhadap peningkatan produksi kelapa sawit pada tanah pasir di Perkebunan Kelapa Sawit Selangkun. *Jurnal Agrikultura* 28(1):15-20.
- Farhad, I.S.M., Islam, M.N., Hoque, S. and Bhuiyan, M.S.I. 2010. Role of potassium and sulphur on the growth, yield, and oil content of soybean (*Glycine max* L.). *Journal of Plant Science* 3 (2): 99-103.
- Fernandez, A. and Guzman C.D. 2013. Quality and nutrition of Pummelo as influenced by potassium. *Journal of Environmental Science and Engineering* 1(2):97-105.
- Kumar, N., Meenakshi, N., Suresh, J. and Nosov, V. 2006. Effect of potassium nutrition on growth,

- yield and quality of papaya (*Carica papaya* L.). Indian Journal of Fertilizers, 2(4), 43-47.
- Mann K.K., Waldo, L.J., Hostler, K., Mann, R.S. and Schumann, A.W. 2010. Estimating relative nutrient uptake by mature citrus trees in field conditions. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 3(12):67-73.
- Mello, S.D.C., Tonhati, R., Neto, D.D., Darapuneni, M. and Pavuluri, K. 2018. Response of tomato to polyhalite as a multinutrient fertilizer in Southeast Brazil. Journal of Plant Nutrition 41(16) 2126-2140.
- Nugroho, P.A. 2015. Dinamika hara kalium dan pengelolaannya di perkebunan karet. Warta Perkaretan 34(2):89-102.
- Pavuluri, K., Malley, Z., Mzimhiri, M. K., Lewis, T.D. and Meakin, R. 2017. Evaluation of polyhalite in comparison to muriate of potash for corn grain yield in the Southern Highlands of Tanzania. African Journal of Agronomy 5(3):325-332.
- Thomas, T.C. and Thomas A.C. 2009. Vital role of potassium in the osmotic mechanism of stomata aperture modulation and its link with potassium deficiency. Plant Signal Behaviour 4(3) 240-243.
- Yemiryahu, U., Zipori, I., Faingold, I., Yusopov, L., Faust, N. and Bar-Tal, A. 2017. Polyhalite as a multi nutrient fertilizer – potassium, magnesium, calcium and sulfate. Israel Journal of Plant Sciences (3)4:145-156.